

# Plantas de Interior (XII)

## **S** *Strelitzia reginae* Banks

Familia: *Strelitziaceae*.  
Origen: Sudáfrica.

### Descripción:

Planta rizomatosa herbácea. Alcanza una altura de 1,8 metros.

Hojas con limbo ovalado y largo peciolo, dispuestas de forma alternativa y opuestas.

Inflorescencia largamente pedunculada, con flores asimétricas que surgen de una espata carnosa abarquillada. Las flores presentan sépalos anaranjados y pétalos soldados de color azul.

El conjunto recuerda a la cabeza de un ave: el ave del paraíso.

### Especies y variedades:

Otras especies del género, también de hoja perenne son *Strelitzia nicolai* y *Strelitzia juncea*.

### Uso:

En zonas de costa crece a pleno sol.

Para florecer necesita mucha luz.

Muy utilizada en jardinería de interiores desde el siglo XIX.

Destaca por su peculiar estructura.

### Referencias:

- La Granja del Atanor de Madrid ofrecía *Strelitzia reginae* en su catálogo de 1897.



*Strelitzia reginae*.  
Curtis's Botanical Magazine, 1915.  
Missouri Botanical Garden.

## **T** *Tetrastigma voinierianum* (Sallier) Pierre ex Gagnep.

Familia: *Vitaceae*.  
Origen: Indochina.

### Descripción:

Planta trepadora tropical, de tallos leñosos, perennifolia.

Está provista de zarcillos con los que trepa a alturas que pueden ser superiores a los 8 metros. Hojas compuestas palmeadas, con 5 folíolos de más de 20 centímetros cada uno, verde brillante en el haz y con un tomento denso en el envés. Flores insignificantes en verano.

### Especies y variedades:

Aunque el género tiene cerca de 90 especies, la única especie cultivada es *Tetrastigma voinierianum*.

Otras especies son *Tetrastigma bracteolatum*, *Tetrastigma leucostaphylum* y *Tetrastigma serrulatum*.

### Uso:

Se trata de una magnífica trepadora para invernadero. Es de crecimiento rápido.

Prefiere zonas sombreadas, bien iluminadas pero sin sol directo. Zonas climáticas: 10-12.

### Referencias:

- El *Dictionnaire pratique d'horticulture et de jardinage* de Nicholson-Mottet (1892-1899) la describe como *Vitis voinieriana*, aunque duda de su clasificación.



*Tetrastigma leucostaphylum*.  
Hendrik van Rheede, *Hortus Indicus Malabaricus* (1686).  
Missouri Botanical Garden.



*Tetrastigma voinierianum*.  
Revue Horticole, 1902.  
Harvard University Botany Libraries.

## **T** *Thunbergia alata* Bojer ex Sims

Familia: *Acanthaceae*.  
Origen: África tropical.

### Descripción:

Planta trepadora tropical, perennifolia. Vigorosa; trepa hasta 3 metros o más.

Tallos cuadrangulares, volubles, con pilosidad. Hojas cordadas de 8 centímetros de largo, con peciolo alado, verde claro con tomento en el envés.

Flores axilares solitarias. Cáliz pequeño envuelto en dos brácteas infladas. Corola tubular con 5 lóbulos, normalmente naranja con el centro negro.

Existen variedades de colores amarillo, blanco, rosa...

Florece principalmente en verano, aunque con el adecuado régimen de temperaturas puede hacerlo todo el año.

### Especies y variedades:

Otra especie de interés es *Thunbergia grandiflora*.

### Uso:


A menudo se cultiva como anual.

Presenta cierta resistencia a heladas débiles.

Zonas climáticas: 9-12.

### Referencias:

- La Quinta de la Esperanza de Madrid incluía *T. alata* en su Catálogo de Simientes de Flores de 1867.



*Thunbergia grandiflora*.  
L'illustration Horticole, 1895.  
Missouri Botanical Garden.



*Thunbergia alata*.  
Paxton. Magazine of Botany, 1839.  
Smithsonian Institute.

## **T** *Tradescantia zebrina* Bosse

Familia: *Commelinaceae*.  
Origen: Sureste de Estados Unidos. Este de Méjico.

### Descripción:

Planta perennifolia herbácea, tapizante. Forma matas extendidas de 15 centímetros de alto.

Cuelga en muros o macetas.

Hojas ovado-oblongas, alternas, sentadas. Con franjas plateadas y verde oscuro en el haz y rojizas en el envés.

Flores pequeñas con tres pétalos redondeados, de color rosa. Producidas sobre todo en primavera y verano.

### Especies y variedades:

Otras especies del género son ampliamente utilizadas como ornamentales de interior, como la *Tradescantia spathacea* y *Tradescantia pallida*.

### Uso:

Especie muy utilizada en jardines de interior y exterior desde el siglo XIX.

### Referencias:

- La Quinta de la Esperanza, de Madrid, incluía esta especie en su catálogo de 1876-77. También la incluía la Granja del Atanor de Madrid en su catálogo de 1897.

### *Tradescantia spathacea*.

*Icones pictae plantarum rariorum*, 1790.  
Missouri Botanical Garden.



*Tradescantia zebrina*.  
Revue Horticole, 1855.  
Harvard University Botanical Libraries.

## **W** *Woodwardia radicans* (L.) Sm.

Familia: *Blechnaceae*.  
Origen: Suroeste de Europa.

### Descripción:

Helecho siempreverde presente en la flora de Canarias y de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco.

Puede alcanzar 1,8 metros de altura, extendiéndose más de 2 metros.

Brota a partir de un rizoma superficial.

Las frondes bipinnadas alcanzan los 2,5 metros de longitud. Son arqueadas, con el extremo que toca el suelo, lo que hace que emitan raíces los bulbillos que presentan, originando nuevas plantas.

### Especies y variedades:

Otra especie del género es *Woodwardia fimbriata*.

### Uso:

Planta muy cultivada desde el siglo XIX en invernaderos fríos de toda Europa.

Idónea para su presentación sobre pedestales o columnas.

### Referencias:

- El Establecimiento Horticola de Capuchinos de Valencia incluía esta especie en su catálogo de 1859.



*Woodwardia radicans*.  
The floral world and garden guide  
New York Botanical Garden.

## **Z** *Zantedeschia aethiopica* Spreng.

Familia: *Araceae*.  
Origen: Sudáfrica.

### Descripción:

Planta herbácea perennifolia, rizomatosa. Alcanza los 90 centímetros de altura formando grandes matas. Puede vivir sumergida 30 centímetros en agua. Hojas sagitadas con largos peciolo, color verde brillante.

La inflorescencia es un espádice amarillo rodeado de una espata blanca de forma acampanada, con un largo pedúnculo.

### Especies y variedades:

*Zantedeschia eliottiana*, de espata amarilla, y *Zantedeschia rehmannii*, de espata rosa-morado, han dado lugar a los híbridos de Nueva Zelanda, con colores naranjas, rosas, bronce y rojos y con hojas a menudo moteadas. Son de tamaño más pequeño que *Z. aethiopica* y prosperan en las mismas zonas climáticas.

### Uso:

Planta ornamental muy utilizada desde el XIX.

### Referencias:

- El catálogo de 1876-77 de la Quinta de la Esperanza de Madrid incluía la *Z. aethiopica* como *Richardia aethiopica*. La Granja del Atanor de Madrid empleaba la misma denominación en su catálogo de 1897. El vivero J.P. Martín de Madrid la denominaba *Richardia africana*, y la ofrecía como planta acuática en su catálogo de 1890.

### *Zantedeschia eliottiana*.

*The Garden*, 1894.  
Univ. of Massachusetts  
Amherst Libraries.



*Zantedeschia aethiopica*.  
Haarlem Flora Eeden, 1873.  
Missouri Botanical Garden.



MADRID

Ayuntamiento  
de Madrid  
Área de Gobierno de  
Medioambiente y Movilidad

